

Algumas coisas que um bebê com audição normal deve ser capaz de fazer:

Recém-nascido a 3 meses

- Pisca ou pula quando ouve um som alto e súbito
- Acalma-se ou sorri quando falam com ele(a)
- Emite sons como "ohh," "ahh"

3 a 6 meses

- Procura por sons com os olhos
- Começa a balbuciar ("baba," "mama," "gaga")
- Usa vários sons, grita e ri

6 a 9 meses

- Vira a cabeça na direção de sons altos
- Compreende "não" ou "tchau"
- Balbucia, por exemplo "baba," "mama," "gaga"

9 a 12 meses

- Repete sons e palavras simples que você emite
- Usa corretamente "mama" ou "papa"
- Responde a música ou canto
- Aponta para objetos e brinquedos favoritos quando pedem a ele(a)

Se você tiver perguntas sobre a audição do seu bebê ou esta lista, consulte o profissional de saúde do seu bebê.

Onde mais posso obter informações?

New Jersey Department of Health and Senior Services
Early Hearing Detection and Intervention Program
PO Box 364 • Trenton, NJ 08625-0364
(609) 984-1343 (TTY)
(609) 292-5676 (Somente voz)
ehdi@doh.state.nj.us
www.nj.gov/health/fhs/ehdi/

O seu bebê pode ouvir?

O primeiro teste de audição do seu bebê

(Can Your Baby Hear? - Portuguese)



Jon S. Corzine
Governor



Heather Howard
Commissioner

Por quê a audição do meu bebê deve ser testada?

- A maioria dos bebês pode ouvir bem ao nascer, mas alguns bebês não.
- Testamos todos os bebês para descobrir quais talvez não sejam capazes de ouvir.
- O teste é a única maneira de descobrir se um bebê tem perda de audição.
- É importante identificar a perda de audição o mais cedo possível. Os bebês, cuja perda de audição não for identificada cedo, terão dificuldades no aprendizado.
- Se identificarmos a perda de audição cedo, poderemos ajudar o seu bebê de várias maneiras.

Certifique-se de que a audição do seu bebê seja testada antes de deixar o hospital.

O que devo saber sobre o teste?

- O teste é seguro e indolor e pode ser realizado em 10 minutos.
- A maioria dos bebês dorme durante o teste.
- Você receberá os resultados do teste antes de deixar o hospital.
- Certifique-se de informar ao hospital o nome da clínica ou do profissional de saúde do seu bebê para que o hospital possa enviar os resultados para eles.



Por quê alguns bebês precisam de outro teste de audição?

- Alguns bebês podem precisar de outro teste pelos seguintes motivos:
 - *fluido no ouvido*
 - *o bebê estava se movendo muito*
 - *ruído na sala de teste*
 - *o bebê tem perda de audição*
- A maioria dos bebês que precisam de outro teste tem audição normal. Alguns terão perda de audição.
- Se o seu bebê não passar no teste de audição, certifique-se de que ele(a) seja testado(a) o mais rápido possível.

Um recém-nascido pode passar no teste de audição e ainda ter perda de audição?

- Sim, alguns bebês ouvem bem o suficiente para passar no primeiro teste, mas perdem a audição mais tarde devido aos seguintes motivos:
 - *algumas doenças*
 - *alguns medicamentos*
 - *algumas lesões*
 - *histórico familiar de perda de audição*
- Fique atento a sinais de perda de audição à medida que o seu bebê crescer.
- Use a lista no verso como um guia.